



הנקה



תכנית "אם לאם" מנוהלת במסגרת המרכז לחקר וקידום בריאות האישה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

טלפון: 08-6477562/3
טלפון: 08-6472877
womcen@bgu.ac.il

תְּלַקְדֵּשׁ תָּרַאֲכֶנָּה וְלֹא־תִּשְׁמַע
תְּסַרְפֵּנָה וְתַּבְּשֵׂרְךָ וְתַּבְּשֵׂרְךָ
וְתַּבְּשֵׂרְךָ וְתַּבְּשֵׂרְךָ וְתַּבְּשֵׂרְךָ

זרע רצף העיון בשלביותר, השיעים הראשונים מתחילה בקבוק, הגב מזדקף והתינוק מוכן לשבת (בתחילת בתמייה) להושיט יד אל פין מזונות מוצקים. זה גם הזמן בו נעלם ורפלקס שבוי דוחפת הלשון את הכתפייה מפה.

בשלב זה, תינוקות ובין משתוקקים לקבל מזונות המבוגרים המונחים על השולחן.

דינור

- * הנקה היא המדן המתואם ביותר לתינוק.
 - * הנקה היא לא רק ופלקס טבעי של התינוק. זו גם מיניות נרכשת.
 - * מגען הנקה עובד על בסיס היצע וביקוש, כמות החלב שתווצר תהיה בהתאם למידת הייעקה.
 - * טכנית ייקה נcona תבטית פטמות בריאות וכמות חלב מספקת.
 - * כדי להבטיח הנקה נcona יציבה ומונעת בלבול פטמות, כדי להימנע ממtan בקבוקים ומוסצים בחודש הראשון לחץ התינוק.

בכל שאלה או צורך בעזרה, כדאי לפנות לאיש מקצוע, אשר יתכן עבורך בהתאם אישית על פי צרכיך, רצונתו/
נתוניך ומצבך הבריאותי את הדיאטה שלך.

טיפ: זכרו! שמרי על תחזונה נבונה ומאודנת, אכלי את מה שאתה אהבת אבל אל תגידי. חשוב להרבות בשתייה ובעיקור בכפים.

אין נדע שההركة מספקת?

- * התינוק עירני, פעיל, קולו חזק, עיניו נוצצות, פיו לח וורוד.
 - * התינוק מוטיב וממלא 5-6 טיטולים ביממה החל מהיום ה-5 לחיה.
 - * ביום הראשון בבית מצפים לו 2-4 יציאות ביום (נוידליות או גורריות צהבהבות). תתכנה יציאות בכל אורך.
 - * תינוקות בגיל 5 ימים ועד 3 שבועות שאין להם יציאה אחת ליום. אורי לרדוך ולעקור אותו עליה בממשקלה.

טיפ: דאגו לנ' לשתייה ליד כורסת ההרקה.

מתן תוספות - מוצקים

המלצת משרד הבריאות היא להעיק באופן בלעדי עד גיל שישה חודשים והנעה עם תוספות בהמשך. אין צורך בתוספת מים. מגיל שישה חודשים מתחילה להויסף מזון מוצק בהתאם לשלב ההפתחותי, ובוין הארכות מעת מים. נוטני תרכובות מזון לתינוקות (תמל"ל או פורטולה), גם הם ימשיכו במתן תמל"ל בשילוב המוצקים. מזון מלאים – מוצק, מתאים לתינוקות החל מגיל שישה חודשים – מושלים.

מתצרחות והם חוזרים מהר יותר לשון. רמותו של ההורמון פורולקטין, האחראי על יצירת החלב, עולה יותר בשינה. אך ההנקה בלילה חשובה כיוון שהוא מגבירה את יצירת החלב.

טיפ: נסוי בשבועות הראשונים להשלים את שעת השינה שלך ביום כאשר תינוקך ישן.

אדים (קולייק)

מספר רב של תינוקות סובל מוגדים. תינוקות יונקים סובלים פחות כי הם מקבלים מזון מותאם לאופם ובולטים פחות אוior מתינוקות שאוכלים מבקבוק. חלק גדול ממוקרי הגדים אצל תינוקות יונקים נבע מטכנייקת הנקה לא נכונה. רק לעיתים נדירות יש קשר בין כאבי בטן של התינוק לתזונת האם המזיקה והרבה מיתוסים נקשרו סביב נשא זה. אין המלצה גורפת بعد או נגד מאכלים מסוימים, אך אם את משוכנעת שמדובר מסוים הוא "האשם", נסוי להימנע ממנו לפחות תקופה.

פעמים רבות התינוקות מבקשים בעצם מגע ותנוועה וההורם מפרשים זאת בטעות ככאבי בטן.

מדונות האם

אכלי תזונה מגוונת, בריאה ועשירה. בזמן הנקה.gov האישה שורף 500 קלוריות ביום יותר מהרגיל, אך אתعشiosa לחוש רעב.

אין זה אומר שכעת, בזמן הנקה, את צריכה לאכול בשבלן ובשביל תינוקך, אך עלייך לשמר על תזונה נבונה ומואזנת כדי שתאת אהבת ולא לתוכן את הדיאטה שלך עצה. רוב הנשים יודרות במשקל בתקופת ההנקה באופן מתון ועקביו וחוזרות למשקל לפני ההריון מהר יותר מאשר שאין מעיקות.

אם את מתחשה בהנקה, אל תהסси לבקש ולקבל עדשה מיועצתה הנקה, אחות במחלקת יולדות, אחות בטיפת חלב או בתוכנית "אם לאם".

ישן אימהות שריאות מאד להניק וזה לא קל להן, ישן אימהות שאין יכולות להניק, ישן אמהות שבחרו לא להניק. זה בסדר, כל עוד הבחירה היא מתוק מודעות ולא מהעיר ידע.

כדי ורוצוי להתרנסות בהנקה ולא לוותר בגלל הרגשה של "לא קל לי".

מהלך ההנקה

התינוק יונק משד אחד עד להתרתקות שלו באופן עצמאי. זה הזמן להרימו להוציא אויר ולהוציא צד שני. הרכב החלב משתנה תוך כדי אורהחה לחלב עשיר יותר בשומן, אך אין להעבורי את התינוק משד לשד בזמן קצר, אלא לחכות שישיירר את השד בעצמו.

אחד נניה בטוחים שקיבל את החלב העשיר בכמות מספקת וללא גם יסבול פחות מוגדים.

אם התינוק נרדם וציריך עידוד בין שד לשד, זה הזמן לחתל אותו כדי להעירו ל"קיינוח" בשד השני. אם לא יונק מהשד השני, או אם יונק, אך רק "קיינח", רצוי להתחילה את ההנקה הבאה מהשד שינק ממען פחות כדי לאפשר יצירות חלב שווה בשני השדים ומיעוט גודש. בסוף היureka התינוק יורד מהשד עיון ומונען והשד רה. לקרהת ההנקה הבאה השד מתמלא שוב.

הנקה בלילה

תינוקות אוכלים בלילה בעיקר בשבועות הראשונים. עם הזמן והסתגלות לחווים והבחנה בין יום ללילה, התינוקות לומדים לישון יותר בלילה ולחיות ערים יותר ביום. תינוקות ממשיכים לאכול בלילה גם בחודשים הבאים, אך הארכות ההנקה.

התחלת טוביה להנקה מוצלחת

על מנת להגברת יצור החלב וללמוד את התינוק להכיר אתו כשותפה שלו, יש לאפשר לו הנקה בלתי מוגבלת, יומי ולילה. בשבועות הראשונים תינוקות יונקים 12-8 פעמים ביוםמה. ניהול הנקה נכון יבטיח פטמות בריאות וכמות חלב מספקת.

טיפ: הנקה היא מציצה של הפטמה וההילה. בכדי להגיע לתרנזה זו, החזקי את תינוקך קרוב אליו בطن מול בטן, כאשר ראשו פונה לשד, פיו ואפו פונים להילה.

בשלב הראשון הניחי את התינוק מול השד, כל הגוף מופנה לשד, בטן מול בטן, לכון את הפטמה מול שפטו העליון. כאשר יפתח את פיו להזוכה כמו לפיהוק, הציגו את התינוק בזריזות, על ידי תמייה בעורף וגוו עליון, לשד. (אם אין פותח פיו, ניתן לגורת את דזיות שפותיו עם קצה הפטמה). כתת השפה התחתונה של התינוק וסרטו צריכים להיות הרשומים שנגעים בשד.

סרט התינוק במאן מל האם, הפטמה מעל השפה העליונה ושפטו התחתונה מכוננת לשולי הילה. כתעת פי התינוק מלא בשד האם, התינוק נשם בקלות. יתרון וצטרכי לתפקיד בשד מלמטה. לא להשתמש באכזבות כטב במשמעותם, הדבר מפרע לתינוק לתפוס את הילה.

כדי להימנע מפטן בקבוקים ומוציאים לפחות בחודש הראשון לאחר הלידה, היהת אלה גורם לבלבול פטמות, לפגום במציצה ובהתיצבות הנקה. ידוע כי הנקה מוקדמת כבר בחודר הלידה, מעלה את הסיכויים להצלחת ההנקה.

הנקה היא התזונה הטובה ביותר לתינוק ומומלצת על ידי משרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי (WHO). רוב הנשים רוצחות גם יכולות להניק את תינוקן בהצלחה. ההנקה היא תהליך טבעי, אך כמו כל חוויה חדשה דורשת למידה. האם הטירה והתינוק הרך עדין לא מכירים זה את זה, גם לא את כליל המשחק. ניתן ללמידה להנקה עיילה וליהנות מכל היתורונות שהנקה השוניים. לצורך קבל עזרה ותמיכה בשלבי ההנקה השונים.

טיפ: זכרו שאתה הקובעתי! את צריכה לך חות אחריות וללמוד את תינוקך את הדרך אליה אתם יוצאים יחדיו.

תינוק הרוצה לאכול, מתעורר ומחילה להראות סימני רעב ולהפסיק את השד. הוא מפנה את פיו הפער ואת פניו הצדיה בחיפוי. אם לא יכול את מבוקשו יתחיל הבכי. רצוי מכך לדוחות את סימני הרעב המוקדים ולתת לו לאכול לפני בוא הבכי.

בימיים הראשונים לאחר הלידה, קיים כבר "קולסטרום" (חלב ראשוני) שהוא עשיר ומכיל את החיסון הראשוני של הרך הנולד, מכotto מעטה ומורכזת. בימיים אלה התינוק עוד לא מושך רעב וכן הקולסטרום מספיק לו עד שתיתווצר כמות החלב המלאה.